

## QUÆSTIO MEDICA AGITANDA

IN PUBLICIS MEDICORUM SCHOLIS CELEBERRIMÆ ACADEMIÆ CADOMENSIS,

PRO LICENTIATUS GRADU CONSEQUENDO,

M. PETRO ANGO, DOCTORE MEDICO ET PROFESSORE REGIO, PRÆSIDE.

An soli sanorum plethora vena sectio?

45

**S**ANGUINEM incisâ venâ mitti novum non est, sed nullum pene esse morbum, in quo non mittatur; novum est; hæc erat olim Celsi opinio. Nunc verò morbum esse aliquem, in quo mittatur, novum & inusitatum est. Is solus, qui plenitudine athleticâ viget sani; concedunt illud præfidi genus quidam è Neotericis, quos inter eminet Lucas Tozzi; & ipsi agris athleticâ plenitudine laborantibus venæ sectionem dederunt. Quod doctrinæ vitium in nostris etiam hujus ætatis medicos manavit; ex quibus, qui negotiis possent sapientia, toti sunt in specificis quærendis, & remediis singularibus, toti in pulveribus multos ignes passis, & longè ex Arabiâ petitis. Sed hæc minora. Universaliter venditant remedium, spiritum vitæ in ampullâ conclusum essentem cum ætati, omni tempore commodum, velle contenti venâ sectâ eucurritur. Quot & quanta in agros commoda ex spontaneis sanguinis excretionibus redundent, cæcus est, qui neget. Insanum, qui naturam non imitatus fuerit dæcem. Agre mulieres ab innumeris affectibus per mensuras ullationes liberantur: viri, hæmorrhoidum fluxum ad gravissimorum morborum curationem experiantur: juvenes sanguine è naribus profusente febribus solvantur. Quod sponte factum felicitate evenisse vident, id arte tentare abortivis, hæmophobie & si sanguis parvus prehensendus, ita & prodigius, qui vel in levissimis affectibus effrenatâ mittendi licentiâ factum satis esse non putet, priusquam vasa sanguine exhaustis. In omnium remedium administratione certi sunt & præfiniti modi; & quod remedi genus majus est, eò majorem pollutat in vasis præscribendis quantitate animadversionem.

**C**UM inæqualis est sanguinis ad vasa communis, cum injusta & dissentanea ad alveum, quem decurrit; proportio; tunc sanguis fibras distendit, & gravat nitendo, exitumque minatur, qui sive purus, sive impurus, haud cunctanter est emendus. Plethora ad vires gravitate corporis cognoscitur; in eâ plus est sanguinis, quam à corde & à menyngibus trudi possit, & à minoribus vasis repelli; vim ipsorum elatiori sanguis fecit tantam, ut resistere nequeant: exonerato per venam sectam vase resistit elater, minor sit partium sanguinis pressio, minor ad fibras nîsus, reddit naturalis ab arteriis in venas itus & reditus. Organo sanguinis debetur venæ sectio; hæc præcaveatur immanes hæmorrhagie, inflammationes accerunt, deliria, vigilie, moleste præcordiorum anxietates: hæc reducitur malla sanguinis ebullient ad eam morbi mediocritatem, quæ ad depurationem prærequiritur, & ad secretionem materie peccantis suo tempore peragendam. Morbi magnitudo sola non est unum sanguinis mittendi indicium; sanguinis corruptio & putredo nunquam missionem postulat eradicationem. In summa plenitudine copiosior sit prima venæ sectio siquidem dimoveatur & abripiuntur molliores particule capillaribus inherentes; particule illæ relectæ novam inducunt in vasis plenitudinem. Inane non est ventilationis nomen, non potest enim educi sanguis, quin in illius locum aer sufficiatur; ille enim pellit aëra, hic circulo facto, quò minus resistit, intra granula sanguinea majore se miscet copia, etiamque novo efficit motu, quo removeatur corporicula interioribus poris cutis insidentia; hinc transpiratio fit liberior, quod est summum è venâ sectâ præfidium. Si quando fibræ tensæ nimis & crispæ secretionem retardant, venæ sectione laxitas solidis & fluidis consiliatur eâ, quæ humores per intermicula facilius promoveantur.

**V**ETERES latuisse sanguinis circuitum, jure, an injuria, exprobrant Neoterici: illi ex ignoto majus emolumentum ad assilctorum salutem perceperunt; hi ex noto circuitu solam artis ostentationem. Veteres perinde ac si struuntur vaforum, & motum sanguinis novissent, triplicem sanguinis missionem ritè instituerunt, *evacuatoriam, revulsoriam, & derivatoriam*, ex diversis mittendi locis. Cum morbus in toto corpore, & per vasa omnia sanguinis hulus est, quam partem feces, quam venam incisâ, parvi refert. Moles enim citatur undecunque inminuta, modò neutra modum. Citatâ mole, hoc ipso vortex sanguinis quique liberior, quem ita & reditu definias. Hanc sanguinis missionem cum Veteribus voces evacuatoriam; at si morbus, puta in latere dextro, axillam inter & humerum accendatur; si sanguis stagnari proximus inflammationem jamjam paraturus sit, hæc erat Veterum prudentia, ut circa partem affectam, & causam antecedentem, humorum impetum, fluxum, & multitudinem semper attenti, illapsurum sanguinem in partem diversam, & oppositam revellerent; & opporiam revellerent; & demptâ verò plenitudine, & moderato fluxu, humorem parti insidentem, vicino vase incito, deducunt. Nihil porro prudentius, nihil sanguini circumventi, & mechanica legibus conveniens. Irident novi; sed rursus causam requirimus. Nam quæcumque vena secetur, saltem per totum tempus, quo sanguis mittitur, uberior rivus per omnes arterias rursus, à quibus vena secta recipit sanguinem, derivatur; si vix quæ brevius est iter, minimeque decurrit spatii; si vix quæ sanguis præcedens definit esse impedimento subsequenti; si vix utraque de causâ. Age porro sanguinem naturalis quantitate fluentem, partem affectam transire non potest, sed ibi moratur, & calorem concipit morbosum; quid ergo? sectâ venâ eisdem lateris, cum magis affluat sanguis per arteriam, in partium substantiam affunderet ille, inflammationem & dolorem aucturus. Non irident igitur, qui venam lateris oppositi incidendam curant, ut, siquid aliolum determinatione, major hæc deducatur sanguinis copia; minor verò in partem affectam: hæc arte sanguis lubducitur parti dolenti, dum majorem fundit sanguinis copiam in cordis dextrum ventriculum; & minorem à sinistro recipit, si ad latum sectam confusas: tunc inflammationis auctor facilius in venas deponitur, & pars sua fasciâ subvelatur, doloreque mitecitur. Est tamen ut aliquando agros non plethoricos missio sanguinis ex affecto latere prodigii instar subito restituit; nam subito auctâ velocitate sanguinis in parte affectâ, rumpuntur obices, abripiuntur morbo materia. Si que his Arabum iteri & Græcorum Scholas facile componitur; illis afferentibus mittendum esse sanguinem è sano latere, his contra è dolente.

**R**EVULSIO alia fit in parte distanti, alia in distantissima, ut in pede; hæc poro illi adhibere non semper licet. Quid enim si forte nullis vegetis menses cursum suum supprimant, in caput rapiantur, copioseque intempestivâ Meninges distendant; premant, quam pressioem? Quid si subito cessante thoracicarum partium inflammatione, rapiatur humor ad cerebrum, lethalem, asphensâ sectâ, non præcebis phreniticâ? In revulsione venæ sectæ digitum identidem superponit Chirurgus; aliquantum enim tempus requiritur ad exquand hinc inde sanguinis libramentum. Quò vortex sanguinis magis laborat aut copia, aut impetu, aut stagnatione in pulmonibus, eò magis profundatur. Quid enim ulceri aliquot pares-eo erunt levando pulmonis vortici in peripneumonia, qui vixinti sanguinis libras plus centies in die convellit præcaveret. Quibilibet in morbis, cum putredo accedit humorum plenitudini, cum imminet stagnatio, aut partium interiorum ad inflammationem dispositio, sanguis ineunte morbo mittendus: plures intensis inflammationibus pereunt, quum morbi malignitate. Nec tæ à venâ; sed de illis revelluntur? Error est per moderatam phlebotomiam, humor ad interiora retrahi, & ad viscera revocari: contrarium civinc determinatio sanguinis intro foras. In pari & æquâ venæ sectionis, & purgationis necessitate, præterea venâ sectâ; detrahatur sanguinem sequitur humorum morio placidissima, fluxile redditur corpus, viresque laxiores sinant humores cathartico effluere. Hos omnes mittendi scopos non capit hæmophobus; sanguis enim vitæ thesaurus est, exclamat; sed thesaurum aliquando imminuere juvat, ut vitam redimas.

**N**ULLO non morbi tempore mitti potest sanguis, verum quò maturius, eò melius. Nulla tamen cruditas suspicio remanet, modò res concessioem omnem expectet. Inconsultus Arabum Princeps à phlebotomiâ initio orbi abstinuit, quòd noxios humores exagitet, solam autem demit stum & augmentum præterierit. Quibus in morbis motus plus teleres, moreque ferri, cunctatio ad secandum periculosa. Vigente morbo, si inflammationem vigeat interna, si symptomata ingraveant, nulla spes est sine sanguinis detractioe: si res alter ceciderit, totum opus naturæ est committendum. Ut universalem temporum, ita & particularium, quibus morbi curentur, delectus habendus. Expectanda semper paroxysmorum remissio, vel intermissio, quæ si non sperentur, secandi occasio non est prætermittenda. Nihil æquæ Artem Medicam utique ad mutuum fluentis locorum: periculi res est plena, immutata locorum expectatio. Mittre sanguinem ad animi usque deliquium, & corpus est maxime incertus & periculosus: hinc enim pulsatimines vel ab icâ venâ animi liquantur; inde verò viri fortes lethalem, priusquam animo concidant, patiuntur evacuationem, quam syncope, & proxima mors consequitur. Amplius sanguinis ad cor refluxus subdignationem, quam refrigeratio comitatur, vel etiam in ardentissimis febribus atate florente perhorrebitur, sicut minor sanguinis effervescencia sequatur. Solemni Hippocratis jurejurando non dubia & periculosa quæque vitatoris promissum; satis est missionem sanguinis, quæ ad morbi curationem necessaria fuerit, partiri, quum uno ictu totum profundare: constantior & tutior scopus à viribus agrotantis delumitur, à viri antè actâ, à patientis habitu, à morbo, ceterisque id genus; nam in secandi venâ, non fecus est in dijudicandi litibus, facti, quam juris questio: sæpe fit obcurior, inquit Pernelius. Virum semper maxima habenda ratio, sed à languidis oppresse sunt distinguenda; quòd maior virium oppressio, eò felicitior sanguinis distractio; si fluente sanguine impeditur vires expelluntur. Motus sanguinis tardis in vasis se movens acceleratur. Parendum pueris, senibus, & gravidis, aliis jubeat necessitas, ignato & timido in solâ sanorum plethora sanguis nem mittere expeditissimum est; usum habenti, & sequam omnia circumspicienti in morbis difficillimum; attemen conclusimus.

Non ergo soli sanorum plethora vena sectio.

Hæc Theses proponebat FRANCISCUS CAROLUS DESPAIGNE, Pontodomareus, Baccalaureus Medicus, die Sabbati 3. Novembris,

A. R. S. H. M. DCCXIV. ab hora 8. ad meridiem.



CADOMI, Apud ANTONIUM CAYELIER, Regis, &amp; Academia Typographum.